



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Vigne

www.srpv-midi-pyrenees.com



Service Régional de la
Protection des Végétaux
Cité Administrative
Bâtiment E
Bd Armand Dupontal
31074 Toulouse Cédex
Télécopie : 05.61.10.62.72
Tél. abonnements :
05.61.10.62.70

Imprimé à la station
d'Alertes
Agricoles de Midi-
Pyrénées
Directeur gérant :
J.P. MORZIERES
Publication périodique
C.P.P.A.P n°532AD
ISSN n°07523092

Le vignoble à ce jour :

Tous les cépages précoces (Colombard, Chardonnay, Gros Manseng, Gamay, Merlot) sont au stade 17 (boutons floraux séparés). Les cépages plus tardifs (Cabernet Franc, Ugni-blanc, Negrette, Syrah, Tannat) sont au stade 15 (boutons floraux agglomérés).

Mildiou

Les premières taches de mildiou sont visibles sur le Gers depuis le 8 mai sur pampres et confirmés sur feuilles le 11 mai sur ce même vignoble. Les pluies orageuses du week-end dernier (20 à 50 mm selon les vignobles) sont à l'origine de nouvelles contaminations. De nouveaux orages sont annoncés par Météo France pour les jours à venir.

■ **Tous les vignobles doivent être protégés actuellement avec soit :**

- Un produit à base d'anilide type **EPERON Mix Pépité** (2Kg/ha) ou **EPERON Pépité** (2,25 Kg/ha), **CLOVIS** ou **CARLIT Express** (4,5 Kg/ha),

- **ROXAM Combi** ou **ELECTIS Pro** (2 Kg/ha),

- Un produit à base d'iprovalicarbe ou dimétomorphe ,

- Le 1^{er} produit systémique type **MIKAL Flash** (4 Kg/ha), **RHODAX Express** (4 Kg/ha), **SILLAGE** (4 Kg/ha),

- **CABRIO Top** (2 Kg/ha) pour une protection mixte mildiou/oïdium/black-rot.

Black-rot

Aucune tache n'a été observée.

■ **Sur les rares parcelles atteintes en 2005, utilisez un produit mixte lors du traitement mildiou ou oïdium.**

Oïdium :

Pas de symptôme observé à ce jour.

■ **Dans toutes les situations arrivant au stade 17, démarrez la protection soit avec :**

- le 1^{er} **IBS** type **SCORE** (0,12 l/ha), **INDAR EW** ou **IMPALA** (0,75 l/ha) ou **ATOMIUM** (0,66 l/ha),

- Un produit à base de strobilurine type **CABRIO Top** pour ceux qui l'utilisent en protection mixte mildiou/black-rot/oïdium, **STROBYDF** (0,2 kg/ha), **FLINT** ou **CONSIST** (0,125 kg/ha).

Ver de la grappe

Le premier vol se termine. Il a été en général faible excepté sur les vignobles de Gaillac, du Brulhois, certains secteurs de Cahors (Puy L'Evêque, Anglars), du Gers (Cassaigne) et de Fronton (Castelnau d'Estretfonds). Des pontes sont visibles actuellement sur ces parcelles.

■ **Dans la majorité des situations, aucun traitement ne se justifie sur cette première génération.**

■ **Sur parcelles avec dégâts importants à la récolte 2005 et avec des piègeages importants pour cette 1^{ère} génération, un traitement est envisageable uniquement dans cette configuration entre le 15 et 19 mai :**

- avec un larvicide préventif type **KARATE Zéon** (0,175 l/ha), **PYRINEX ME** (1,2 l/ha), **DECIS Protech** (1,17 l/ha), **TALSTAR Flo** (0,3 l/ha), **DURSBAN 2** (1,25 l/ha).

Remarque : En cas de doute sur l'opportunité de ce traitement, vous pouvez nous contacter.

Le CONCOURS MILDIOU est toujours ouvert

Comme chaque année, nous vous demandons de bien vouloir nous signaler la découverte des premières taches de mildiou.

Vous pouvez nous expédier ces feuilles dans du papier journal, le tout dans un sac plastique adressé à :

Fredec Midi-Pyrénées
Complexe Agricole Auzeville
2, route de Narbonne – BP12267 – Bât43
31322 CASTANET TOLOSAN
Le vainqueur se verra récompensé

► **Mildiou :**
Première taches observées les 8 et 11 mai sur le Gers.

Oïdium :
Démarrez la protection.

Ver de la grappe :
Le 1^{er} vol se termine. Un traitement se justifie sur les zones à risque entre le 15 et le 19 mai.